




LISINOCOMP GENERICON (Lisinopril + hidroklorotiazid) PËRMBAJTJA E SUBSTANCËS AKTIVE: Lisinopril në formë dihidrati dhe hidroklorotiazid VEPRIMI: Lisinopriili është inhibitor i enzimës angjotenzinkonvertazë, me përmbajtje kimike të ngjashme me enalaprilin. Krahasuar me kaptoprilin dhe enalaprilin përthithet më ngadalë, vepron më gjatë dhe merret si dozë e vetme ditore. Komponenta tjetër e barit, hidroklorotiazidi është diuretik tiazidik, i cili nuk ka ndikim në presionin arterial normal, por, në gjendjet hipertenzive, ai ul presionin e rritur të gjakut. Efekti antihipertenziv i këtij medikamentit shfaqet pas 1-2 orësh dhe zgjat rreth 24 orë. Indikacionet : Hipertensioni arterial, dema, e shkaktuar nga insuficiencia kardiake, renale apo ajo hepatike KUNDËRINDIKACIONET: Hipersensitiviteti ndaj përbërësve të medikamentit ose ndaj sulfonamideve, Nëse pacienti ka vuajtur nga edema angjoneurotike e shkaktuar nga ndonjë ACE inhibitorë ose substancë tjetër, Mungesë urinimi ose përkeqësim i rendë i funksionimit të veshkave, Stenoza e arteries renale, Shtatzënia dhe gjdhënia, Fëmijët. EFEKTET ANËSORE TË MUNDËSHME: Hipotension arterial, dhimbje koke, marrje mendësh, kollë e thatë, lodhje, tharje e gojës, neveri, dhimbje barku, diare, probleme me tretjen e ushqimit. DOZIMI DHE MËNYRA E PËRDORIMIT: Doza normale është: i tabletë Lisinocomp semi (10+12.5mg) në ditë. Nëse veprimi është i pamjaftueshëm atëherë mund të ordinohet Lisinocomp mite (20+12.5mg) ose Lisinocomp (20+25mg) tableta. Tabletat mund të merren me ujë para, gjatë ose pas ngrënies.

Lisinocomp



Përfaqësues Ekskluziv për Kosovë:



Pharma plus

Pharmaplus
Rr. "28 Nëntori"
Qendra Tregtare te PTK
Tel/Fax: 038 551 001
Email: pharmaplusllc@gmail.com



Lisinocomp Genericon

Forma farmaceutike dhe doza

Lisinocomp "Genericon" tableta
(Lisinopril 20 mg + Hydrochlorothiazide 25 mg)

Lisinocomp "Genericon" mite tableta
(Lisinopril 20 mg + Hydrochlorothiazide 12,5 mg)

Lisinocomp "Genericon" semi tableta
(Lisinopril 10 mg + Hydrochlorothiazide 12,5 mg)

Përparësitë klinike për përdorimin e Lisinocomp "Genericon"

- Efikas në mjekimin e sëmundjeve të ndryshme kardiovaskulare (hipertensioni, insuficiencia kongjestive e zemrës, hipertensioni renovaskular)
- Zvogëlon shkallën e morbiditetit dhe mortalitetit të pacientët me infarkt miokardi
- Kontrolla në mënyrë të vazhdueshme e shtypjes së gjakut në periudhë prej 24 orëve

Indikacionet

- Hipertensioni esencial dhe renovaskular si monoterapi ose në kombinim me barna tjera antihipertenziv
- Insuficiencia kongjestive e zemrës, si terapi shtesë me barnat diuretike ose sipas nevojës edhe digitalisit
- Infarkti akut i miokardit (në afat brenda 24 orëve)
- Nefropatia diabetike

Dozimi

Indikacionet	Doza fillestare	Doza e mbajtjes	Doza max.
Hipertensioni esencial	1 x 10mg	1 x 20 mg	<80 ng
Hipertensioni renovaskular	1 x 2,5 – 5mg	1 x 20 mg	<80 ng
Insuficiencia e zemrës	1 x 2,5 mg	1 x 5–40 ng	<80 ng
Pas infarkt të miokardit	1 x 5mg	1 x 10 mg	<80 ng
Nefropatia diabetike (Diabeti tip 1)	1 x 2,5 mg	1 x 10–20mg	<80 ng
Nefropatia diabetike (Diabeti tip 2)	1 x 2,5 mg	1 x 10–20mg*	<80 ng

HULUMTIMET KLINIKE PËR EFIKASITETIN E LISINOCOMP "GENERICON"

- Lisinocomp "Genericon" i administruar brenda 24 orëve të hospitalizimit pas infarkt të miokardit zvogëlon mortalitetin pas 6 javëve 30% pas 6 muajve 20% krahasuar me placebo të pacientët me diabet (IDDM dhe NIDDM)**. (*Circulation 1997;96:4239-4245. Zuanetti et al, Effect on Ace Inhibitor Lisinopril on mortality in diabetic patients with AMI*).
- ACE inkibitorët (Lisinocomp "Genericon") ngrisin tonusin parasimpatikomimetik dhe ndihmojnë në restaurimin e ekuilibrit të sistemit autonom në CHF***.
- ACE inkibitorët (Lisinocomp "Genericon") parandalojnë vazokonstriksionin koronar simpatikomimetik, përmes uljes së nivelit të angiotenzinës 2. (*Circulation 1997;96:148-153 Intracoronary Angiotensin 2 potentiates coronary artery sympathetic vasoconstriction in Humans.*)



Rezultatet e hulumtimit ATLAS për efikasitetin e Lisinocomp "Genericon"

Regjimi me dozë të lartë:

- zvogëlon rrezikun nga vdekja ose hospitalizimi për 12%

Regjimi me dozë të ulët:

- Hipodozimi i Lisinocomp "Genericon" përgjysmon 50% shkallën e benefitit terapeutik, prandaj nevojitet dozimi adekuat i këtij preparati të kombinuar.
- Preparati Lisinocomp "Genericon" (Lisinopril/HCTZ) rritet përqindjen e suksesit të mjekimit për 19% krahasuar me terapinë me 2 barna Lisinopril + diuretike (Dezii et al.)



*Doza adaptohet që shtypja diastolike të mbahet nën 90 mmHg

*IDDM - insulin-dependent diabetes mellitus; NIDDM- non-insulin-dependent diabetes mellitus

**(*JACC 1993; 21:655-661. Sustained augmentation of parasympathetic tone with angiotensin converting enzyme inhibition in patients with CHF*)