



Pantoprazol "Genericon" Tableta gastro-rezistente 40 mg & 20 mg FORMA DHE PAKETIMI: Paketime origjinalne nē folie alumini me 14, tableta gastro-rezistente 40 mg, respektivisht 14, tableta gastro-rezistente 20 mg. SI VEPRON PANTOPRAZOL "GENERICON" Pantoprazoli eshtë preparat nga grupi i benzimidazolit që inkibon sekretimin e acidit gastrik përmes veprimit specifik nē pompën protonike të qelizave parietale të mukozës së lukthit. INDIKACIONET: Terapi e kombinuar me 2 antibiotikë adekuat për eradicimin (çrrënjosjen) e Helicobacter pylori dhe për parandalimin e relapsit (rikthimit) të ulcerës së lukthit te pacientët me ulcerë nga H. Pylori. Ulcera duodenale (zorrës dymbëdhjetëgjishtore), Ulcera gastrike (lukthit). Format mesatare dhe të moderuara të reflux oesophagitis, Trajtimi afatgjatë i sindromit Zollinger-Ellison dhe çrrëgullimeve tjera të shoqëruara nga hiposekretimi (prodhimi i shtruar) patologjik i acidit gastrik. KUNDERINDIKACIONET: Nëse jeni alergjik (hipersensitiv) ndaj substancës aktive ose ndaj ndonjërit prej përbërësve të këtij bari, apo barnave tjera të kombinuara. Pantoprazoli sikur edhe barnat tjera nga grupi i inkibitorëve të pompës protonike nuk duhet përdorur në të njëjtën kohë me Atazanavir. PËRKUJDESJET: Te pacientët me çrrëgullime të rënda të funksionit të mëlcisë, doza duhet adaptuar (zvogëluar) konform gjendjes. Trajtimi me barna që zvogëlojnë aciditetin e lëngut të lukthit mund të rrisë lehtë rrezikun e infeksioneve gastro-intestinale, siç janë me Salmonella dhe Campylobacter. Deri më sot nuk ka të dhëna mbi efektin e barit te fëmijët nën 12 vjeç. SHTATZËNIA DHE USHQYERJA ME GJ: Përvaja klinike e përdorimit të Pantoprazolit në femra shztatzena eshtë e kufizuar. Në humutime reprodiktive në shtazë eksperimentale janë raportuar shenja të lehta të fetotoksicitetit. Duhet kushtuar kujdes në rastet e përdorimit të pantoprazolit në gratë shztatzena. Nuk ka të dhëna se pantoprazoli ekskretohet në qumështin e nënës. Gjate periudhës se gjithënjës, Pantoprazoli duhet përdoruar vetën nëse përfitimi nga përdorimi për shëndetin e nënës e tejkalon rrezikun e mundshëm përfutisin përkatësisht foshnjën. EFEKTET MBI AFTËSINË PËR TË DREJTUAR AUTOMJETIN DHE PËR TË PËRDORUR MAKINERI: Pantoprazol "Genericon" nuk ka ndikim në aftësinë për të drejtuar automjete dhe për të përdorur makineri. NDËRVEPRIMET ME BARNAT TJERA: Mundësia e ndërveprimeve me: etokonazol; itrakonazoli; atazanavir; ritonavir; karbamazepinë; kafeinë; diazepam; diklofenak; digoksinë; etanol; glibenklamid; metoprolol; naprosken; nifedipinë; fenitoïnë; piroksikam; teofilinë; kontraceptive orale; fenprocumon ose varfarinë. EFEKTET ANËSORE TË MUNDSHME: Shumë Rrallë: leukopenia, trombocitopenia, reaksione anaflaktike duke përfshirë edhe shokun anaflaktik, depresioni, halucinacione, dezorientim dhe konfuzion, çrrëgullimi i funksionit të qelizave të mëlcisë, nefriti intestinal, gjinekomastia, edema periferike, altralgjia. Efektet anësore tjera: marramendja, çrrëgullime të të pamurit (të pamurit e turbulluar) ankesa të pjesës së sipërme të barkut, barkqitja, kapsllëku; flatuenca (fryerja e barkut), etj. MËNYRA E DHENIES SË BARIT: Bari jept vetëm me recetë mjeku.

Pantoprazol



Përfaqësues Ekskluziv për Kosovë:



**Pharma
plus**

Pharmaplus
Rr. "28 Nëntori"
Qendra Tregtare te PTK
Tel/Fax: 038 551 001
Email: pharmaplusllc@gmail.com



Pantoprazol Genericon

Forma farmaceutike dhe doza

Pantoprazol "Genericon" 40 mg tableta (1 x 14 tableta)

Pantoprazol "Genericon" 20 mg tableta (1 x 14 tableta)


Përparësítë klinike të përdorimit të Pantoprazol "Genericon"

- Pantoprazol "Genericon" mundëson kontrollë efektive në inkibimin e sekretimit të lëngut gastrik
- Pantoprazol "Genericon" manifeston ndërveprime minimale me barna tje raja krasuar me bllokatorët tjerë të pompës protonike
- Efekt tjetër lartë gastroprotektiv gjatë terapisë me barna anti-inflamatore josteroide (AIJS) të pacientët me rrezik të lartë
- Pantoprazol "Genericon" disponon me profil të volitshëm farmakokinetik, pa ndikim në tretjen e ushqimit dhe në shkallën e absorbimit të tij
- Të të moshuarit nuk nevojitet adaptimi i dozës së barit Pantoprazol "Genericon".
- Të format mesatare dhe të rënda të insuficiencës së veshkave nuk nevojitet adaptimi i dozës.
- Bashkë-administrimi Pantoprazol "Genericon" + Clopidogrel nuk shoqërohet me rritje të incidentës së re-infarktit të miokardit (ndërsa incidenta e infarktit është e rritur deri 40% gjatë bashkë-administrimit të Clopidogrel me Omeprazol, Lansoprazol dhe inkibitorët tjerë të pompës protonike).


Indikacionet dhe dozimi me Pantoprazol-Genericon

Indikacionet	Doza fillestare	Doza e mbajtjes	Kohëzgjatja e trajtimit
Reflux esofagitis	1 x 40 mg	1-2 x 40 mg	10 ditë
Ulëra gastrike	1 x 40 mg	1 x 40 - 80 mg	4 - 8 javë
Ulëra duodenale	1 x 40 mg	1 x 40 - 80 mg	2 - 4 javë
Sindromi Zollinger-Ellison	1 x 80 mg	2 x 40 - 80 mg	Sipas indikacioneve
Eradikimi i H. Pylori (terapi e kombinuar)	2 x 40 mg	2 x 40 mg	7 - 14 ditë
Refluksi larin gofaringjal	1 x 40 mg	1-2 x 40 mg	3 muaj
Profilaksa e mukozës së TGI gjatë terapisë me barna AIJS	1 x 20 - 40 mg	1 x 40 mg	Sipas indikacioneve


Profili i ndërveprimeve me barna



Profili i volitshëm i ndërveprimit me barna tjera qëndron në faktin se Pantoprazol nuk inkibon sistemin enzimatik CYP 450 2C19 të mëlcisë



Përdorimi i Clopidogrelit me inkibitorë të pompës protonike me përashtim të Pantoprazol rritet rrezikun për infarkt miokardi për 40%.



Pantoprazol "Genericon" është dukshëm me efikas krasuar me barnat tjera nga grupei I bllokatorëve të pompës protonike në zgjelimin e dispepsisë gjatë terapisë me barna AIJS. Spiegel et al. Am J Med 2006; 119:448.e27-448.e36

Efikasiteti në profilaksën e "Stress ulcerës" është në mënyrë evidente më i shprehur te Pantoprazol "Genericon" krasuar me barna tjera nga grupei I bllokatorëve të pompës protonike. Brette S. Critical Care 2005; 9:45-50.

Përfundimet e arta për Pantoprazol "Genericon"

- Pantoprazol "Genericon" konsiderohet bar i rendit të parë te rastet e terapisë së kombinuar të inhibitorëve të pompës protonike me Clopidogrel
- Pantoprazol "Genericon" redukon frekuencën dhe intezitetin e efekteve anësore gastroduodenale të pacientët që marrin terapi me barna AIJS.
- Pantoprazol "Genericon" ka shkallë të ultë të interaksionit me barna tjera krasuar me preparatet tjera nga grupei I bllokatorëve të pompës protonike.
- Pantoprazol "Genericon" ka profil të volitshëm të sigurisë (efekte anësore të rralla)

Suksesi i mjekimit të ulcerës gastroduodenale me Pantoprazol "Genericon" arrihet më shpejt krasuar me Omeprazol dhe Misoprostol.